

LADERA SUR

GUÍA PRÁCTICA

¿Sabías que en Chile existen siete especies de serpientes?

Conoce a estas incomprendidas criaturas, de gran importancia ecológica




Culebra de cola larga

(*Philodryas chamissonis*)

ENDÉMICA

VULNERABLE



Dentadura opistoglifa

Ovípara

Distribución: Desde Paposo, Región de Antofagasta, hasta Valdivia, Región de Los Ríos, desde la costa hasta los 2.300 msnm.

Amenazas: Presencia de poblados humanos, donde es atacada y muerta por ser considerada una plaga, la destrucción de sus hábitats naturales, la caza para exportaciones no tradicionales y la depredación por perros y gatos.

Datos curiosos:

Es la única serpiente endémica de Chile

Es la culebra más abundante y con más amplia distribución en Chile.

Es la serpiente de mayor longitud en Chile, mide hasta 2.2 metros de largo.

Culebra de cola corta

(*Galvarinus chilensis*)

NATIVA

CASI AMENAZADO



Dentadura opistoglifa

Ovovivipara

Antes conocida como *Tachymenis chilensis*

Se divide en dos subespecies: *G. c. coronellina* y *G. c. chilensis*

Distribución: Nativa de Chile y Argentina. En Chile, abarca desde el norte de la región de Atacama hasta la isla de Chiloé, en la Región de Los Lagos. Desde los 0 a los 3.050 msnm. Es la única serpiente que se encuentra en la isla de Chiloé.

Amenazas: Principalmente se encuentran relacionadas a la presencia de poblados humanos, donde es atacada y muerta por ser considerada una plaga, la destrucción de sus hábitats naturales, la caza para exportaciones no tradicionales y la depredación por perros y gatos.


Dato Curioso: En general es café grisácea. Sin embargo, tiene gran variabilidad de coloraciones, desde café metálico hasta rojizo sin diseños de bandas.

Culebra de cola corta de Perú

(*Tachymenis peruviana*)

NATIVA

PREOCUPACIÓN MENOR



Dentadura opistoglifa

Ovovivipara

Distribución: Nativa de Chile, Perú, Bolivia y Argentina

En Chile se encuentra presente en el altiplano de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, entre los 1.800 a 4.500 ms.n.m.

Amenazas: Amenazada principalmente por la minería y su uso en medicina tradicional.

Datos curiosos:

Es la culebra más pequeña de Chile. En general la longitud total no sobrepasa los 45 cm, pero algunos ejemplares alcanzan hasta 60 cm.

Serpiente marina Amarilla

(*Hydrophis platurus*)

NATIVA

PREOCUPACIÓN MENOR



Dentadura proteroglifa

Ponzoñosa

Antes llamada *Pelamis platura*

Distribución: Esta especie tiene una amplia distribución en áreas tropicales del Océano Pacífico e Índico entre la isoterma 18 a 20°. C. Donoso-Barros (1966) menciona un registro para aguas de Isla de Pascua, lo que parecería constituir el único dato disponible en Chile.

Amenazas: Principalmente la pesca incidental.

Datos curiosos:

Es la serpiente marina más ampliamente distribuida y la más pelágica de todas.

Mide hasta 1 metro de longitud.


Las hembras son significativamente más grandes que los machos.

Culebra elegante de cola larga

(*Pseudalsophis elegans*)

NATIVA

PREOCUPACIÓN MENOR



Dentadura opistoglifa

Ovovivípara

Distribución: Nativa de Chile, Perú y Ecuador.

Es muy poco frecuente en Chile, aunque habita desde la costa hasta los 2.500 m.s.n.m.

Hay registros en muy pocas localidades en la Región de Arica y Parinacota y en la Región de Tarapacá.

Amenazas: Principalmente la degradación de su hábitat debido a la expansión agrícola y la expansión urbana. También se le persigue por considerarla peligrosa.

Culebra de cola larga de Camarones

(*Incaspis tachymenoides*)

NATIVA

PREOCUPACIÓN MENOR



Dentadura opistoglifa

Probablemente ovípara

Antes llamada *Philodryas tachymenoides*

Distribución: Nativa de Chile y Perú.

En Chile, se distribuye por los valles de Arica en Camarones, Lluta y Azapa.

Amenazas: Principalmente la pérdida y degradación de su hábitat por actividades humanas


Datos curiosos: En Chile, de acuerdo al Reglamento de la Ley de caza, N° 19.473 del Servicio Agrícola y Ganadero. (1996), la especie se encuentra definida como Rara en toda su área de distribución.

Culebra alto andina de Simonsi

(*Incaspis simonsii*)

NATIVA

DATOS INSUFICIENTES



Dentadura opistoglifa

Antes llamada *Philodryas simonsii*

Antes llamada *Philodryas simonsii*

Distribución: Nativa de Chile y Perú.

En Chile esta reportada en áreas cercanas a la costa en la Región de Arica y Parinacota.

LADERA SUR

GUÍA PRÁCTICA

¿Sabías que en Chile existen siete especies de serpientes?
Conoce a estas incomprendidas criaturas, de gran importancia ecológica

Revisa el artículo completo aquí