

LADERA SUR

GUÍA PRÁCTICA

Viajeras de invierno: Aprende a identificar estas 10 especies de aves que recorren Chile cuando llega el frío



Descárgala en



laderasur.com

Fotografía: iNaturalist (CC-BY) Noah Strycker

Cuando pensamos en la migración de las aves, solemos imaginar grandes viajes entre países o incluso continentes. Sin embargo, estos desplazamientos también ocurren dentro de nuestras propias fronteras.

En Chile, con la llegada del otoño y el invierno, algunas poblaciones de aves se trasladan desde las zonas australes hacia sectores más cálidos del centro y norte del país, en movimientos conocidos como migraciones latitudinales.

Otras, en cambio, descienden desde la cordillera hacia valles, laderas, humedales y sectores costeros, realizando migraciones altitudinales para encontrar mejores condiciones y disponibilidad de alimento durante los meses más fríos.

No obstante, estos movimientos no son necesariamente realizados por todos los individuos de una especie: en muchas aves solo una parte migra (migración parcial), mientras que otros ejemplares permanecen durante todo el año en sus territorios habituales (residentes).

A continuación, te presentamos algunas de las especies que realizan estos viajes dentro de Chile.

A photograph of a bird, likely a shorebird, standing on a rocky, wet shore. The bird has brown and white plumage and is facing right. The background shows a body of water and a clear blue sky.

LADERA SUR

Orden: Apodiformes

Familia: Trochilidae

LC

Preocupación
Menor
(IUCN)

Picaflor chico

Sephanoides sephaniodes

Se distingue por ser el colibrí más austral del mundo. Es de plumaje verde, pecho blanquecino y alas grises. El macho destaca por su corona iridiscente rojiza.



Tamaño

Cerca de 11 cm



Habitat

Bosques nativos, quebradas con agua, matorrales y jardines

Migración

Parcial

Altitudinal



Latitudinal



En **primavera y verano**, parte de la población se desplaza hacia el sur para reproducirse, desde la Región de Atacama hasta Cabo de Hornos.

Entre **marzo y septiembre**, estos individuos regresan hacia la zona centro-norte del país para pasar el invierno.

Dato del viajero


Ciertas poblaciones son residentes en zonas como Chiloé o el centro-sur. En la ciudad es posible verlo alimentándose de flores de quintral y de *Aloe arborescens*.

Distribución

Todo el año

Temporada no reproductiva

Temporada reproductiva



Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae

LC

Preocupación
Menor
(IUCN)

Viudita

Colorhamphus parvirostris

Es de cabeza redondeada,
dorso parduzco, plumaje grisáceo y
vientre amarillento.

 Tamaño 12 a 13 cm

 Habitat Bosques nativos, bordes de selvas templadas y matorrales húmedos

Migración

Parcial

Altitudinal



Latitudinal



Durante la **primavera y el verano**, se reproduce en el sur, desde la Región del Maule hasta Tierra del Fuego e Isla Navarino.

En **otoño e invierno**, parte de la población se desplaza hacia el norte, llegando desde Atacama hasta Los Lagos.

Dato del viajero


Se puede ver cerca de un maitén, árbol que fructifica en invierno y que le sirve de alimento. Hay poblaciones residentes en el Maule.

Distribución

Todo el año

Temporada no reproductiva

Temporada reproductiva



Orden: Passeriformes

Familia: Furnariidae

LC

Preocupación
Menor
(IUCN)

Canastero del sur

Asthenes anthoides

Es de plumaje parduzco y estriado, con tonos rufos en las alas y una ceja blanquecina.



Tamaño

Entre 16 y 17 cm



Habitat

Estepas arbustivas, pastizales y faldeos cordilleranos o patagónicos

Migración

Parcial

Altitudinal



Latitudinal



Durante la **temporada cálida**, una población se reproduce entre las regiones de Aysén y Magallanes, llegando hasta Cabo de Hornos, mientras otra lo hace desde O'Higgins hasta La Araucanía.

A partir de **marzo o abril**, parte de estos individuos se desplaza hacia el norte, llegando hasta la Región de Valparaíso y, ocasionalmente, más al norte, principalmente por sectores costeros.

Dato del viajero

Durante el invierno prefiere matorrales abiertos y humedales costeros. Se deja ver mejor cuando sube a cantar a la punta de un arbusto o un poste.


Distribución

Todo el año

Temporada no reproductiva

Temporada intermedia

Temporada reproductiva



Orden: Charadriiformes

Familia: Charadriidae

LC

Preocupación
Menor
(IUCN)

Chorlo chileno

Zonibyx modestus

En época reproductiva luce pecho anaranjado, collar negro, vientre blanco y una marcada ceja blanca. En invierno adopta un plumaje parduzco y blanquecino

-  **Tamaño** Entre 19 y 22 cm
-  **Habitat** Vegas, estepas patagónicas, turberas y pastizales

Migración

Parcial

Altitudinal



Latitudinal



Nidifica entre Llanquihue (Región de Los Lagos), la Patagonia y Cabo de Hornos.

Desde **marzo y abril**, las bandadas llegan a la zona centro-norte de Chile, hasta Atacama.

Dato del viajero

Durante el invierno se encuentra en planicies costeras, humedales y desembocaduras de ríos. Puede formar grandes bandadas.

Distribución

Todo el año

Temporada no reproductiva

Temporada reproductiva



Orden: Charadriiformes

Familia: Laridae

LC

Preocupación
Menor
(IUCN)

Gaviota andina

Chroicocephalus serranus

En época reproductiva tiene cabeza negruzca, pico y patas rojo oscuro; en invierno pierde la capucha y presenta un plumaje blanco.

 **Tamaño** Cerca de 44-48 cm

 **Habitat** Lagos, lagunas, embalses y bofedales altoandinos

Migración

Parcial

Altitudinal



Latitudinal



Durante la **temporada reproductiva** se encuentra desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Ñuble.

Entre **abril y octubre**, parte de la población desciende hacia valles, desembocaduras y sectores costeros para pasar el invierno.

Dato del viajero


Puede buscarse en humedales, playas y desembocaduras de ríos (como el río Limarí). En el río Lluta se han registrado hasta 1.500 individuos.

Distribución

Todo el año

Temporada no reproductiva

Temporada reproductiva



Orden: Passeriformes

Familia: Furnariidae

LC

Preocupación
Menor
(IUCN)

Bandurrilla de los bosques

Upucerthia saturator

Es de plumaje parduzco oscuro, garganta y pecho estriados, pico curvado hacia abajo y una característica banda superciliar blanquecina.



Tamaño

Cerca de 21 cm



Habitat

Bordes y claros de bosques de Nothofagus, áreas arbustivas y sectores asociados a cursos de agua

Migración

Parcial

Altitudinal



Latitudinal



Durante **primavera y verano** se distribuye entre las regiones del Maule y La Araucanía, con presencia potencial hasta Los Lagos.

En **otoño e invierno**, parte de la población se desplaza hacia el centro-norte y zonas de menor altitud, llegando hasta la Región de Coquimbo.

Dato del viajero


Puede buscarse en humedales de la zona central. También existen registros en el Parque Nacional Fray Jorge. Presta atención a su voz y movimientos en el suelo.

Distribución

Todo el año

Temporada no reproductiva

Temporada reproductiva



Orden: Passeriformes

Familia: Furnariidae

LC

Preocupación
Menor
(IUCN)

Minero cordillerano

Geositta rufipennis

Es de plumaje pardo uniforme, abdomen pálido, alas acaneladas y una banda superciliar blanquecina.

 Tamaño Cerca de 16 cm

 Habitat Sectores áridos, pendientes con matorrales bajos y zonas rocosas

Migración

Parcial

Altitudinal



Latitudinal



Durante la **temporada reproductiva**, una población se distribuye desde la Región de Antofagasta hasta Los Ríos, mientras que otra entre Aysén y el norte de Magallanes.

Con las **primeras nevazones**, parte de los individuos desciende hacia los valles y la costa de la zona central, mientras que otros se desplazan hacia el norte.

Dato del viajero

Camina por el suelo con pasos erráticos y mueve la cola de arriba a abajo. Es muy vocal: emite un zumbido fuerte desde rocas prominentes.

Distribución

Todo el año

Falta información
sobre sus migraciones



Orden: Anseriformes

Familia: Anatidae

EN

En Peligro
Valparaíso a Magallanes
(RCE)

LC

Preocupación
Menor
(IUCN)

Piuquén

Oressochen melanopterus

Es un ganso grande, de plumaje blanco, alas negruzcas con plumas verdes y púrpuras iridiscentes, pico corto y patas rosadas.

 **Tamaño** Entre 73 y 82 cm

 **Habitat** Bofedales altoandinos, vegas, lagunas y llanuras pantanosas

Migración

Parcial

Altitudinal



Latitudinal



En **época reproductiva** se distribuye desde la Región de Arica y Parinacota hasta el norte de la Región de O'Higgins.

Entre **mayo y agosto**, parte de la población desciende hacia valles, campos de cultivo, pastizales húmedos y humedales de la Región Metropolitana.

Dato del viajero

Durante el invierno puede encontrarse en sectores como Quilicura y Lampa (RM), donde suele formar grupos numerosos.

Distribución

Todo el año

Temporada no reproductiva

Temporada reproductiva



Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae

LC

Preocupación
Menor
(IUCN)

Dormilona tontita

Muscisaxicola maclovianus

Es de plumaje grisáceo, vientre blanquecino y cara oscura. De hábitos terrestres, suele desplazarse corriendo por el suelo y realizar vuelos cortos.

 Tamaño Entre 15 y 16 cm

 Habitat Praderas, playas, valles y humedales



Migración

Parcial

Altitudinal



Latitudinal



En **época reproductiva** se distribuye desde la Región de Los Lagos hasta Cabo de Hornos.

Durante el invierno, parte de la población se desplaza hacia el norte en grandes bandadas, llegando incluso hasta Arica.

Dato del viajero

Puede formar bandadas mixtas con otras dormilonas. A veces pasa el invierno en los techos de los edificios.


Distribución

Todo el año

Temporada no reproductiva

Temporada intermedia

Temporada reproductiva



Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae

LC

Preocupación
Menor
(IUCN)

Diucón

Pyrope pyrope



Es de plumaje gris, vientre blanco y llamativos ojos rojo rubí.

 **Tamaño** Cerca de 21 cm

 **Habitat** Bosques nativos, matorrales, parques urbanos y jardines

Migración

Parcial

Altitudinal



Latitudinal



Se **reproduce** desde la Región de Atacama hasta Tierra del Fuego.

Durante el invierno, las poblaciones más australes se desplazan hacia el norte, llegando a sectores de la zona central y el Norte Chico. También puede realizar movimientos altitudinales.

Dato del viajero


En invierno es frecuente encontrarlo desde Coquimbo hasta Atacama. Le gusta posarse en ramas secas altas, postes y cables, solo o en pareja. A veces se acerca a las ventanas.

Distribución

Todo el año

Temporada no reproductiva

Temporada reproductiva



Viajeras de invierno: Aprende a identificar estas 10 especies de aves que recorren Chile cuando llega el frío

Esta guía se realizó en base a la información disponible en eBird, fotografías de iNaturalist Chile, sonidos de Xeno-Canto, y gracias a la base de datos de la Red de Observadores de aves y vida silvestre de Chile (ROC), contando además con la colaboración de:

César Muñoz

Biólogo, Magíster en Biología de la U de Chile y miembro de la ROC.

Vicente Pantoja

Ingeniero en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile y Magíster en Bioestadística de la Universidad Complutense de Madrid, y coordinador de Birds of the World en Chile.

Basado en el artículo original de
Jözepa Benčina Campos

Diseñado por **Cristian Risco**



LANDER SUR

Fotografía de Leo Lagos – iNaturalist (CC BY)